

ATENȚIE!

GRIPĂ AVIARĂ

Sимптомы и мăsuri de prevenire



Cum se manifestă infecția?

Sимптомы клинические:

- Inapetență, încetarea ouatului;
- Respirație gresoie, fuse, febră;
- Creasta și bărbitele umflate, de culoare roșu închis;
- Pete vinete pe picioare și secreții din cioc și nări;
- Diaree apoasă, de culoare verzuie;
- Infiamarea zonelor din jurul ochilor și gâtului;
- Aripă zburlită, torticolis, răscuirea gâtului, paralizie.

Ce este gripa aviară?

Gripa aviară (*Influență Aviară*) este o boală virală extrem de contagioasă cauzată de virusul gripal H5N8 care afectează mai multe specii de păsări de la care obținem produse alimentare (găină, curcani, prepelițe, bibilici, etc.), precum și păsările de companie și păsările sălbaticice. Ocazional boala o pot contracta mămiferele și omul.

Perioada de incubație este de 4-6 zile.



Cum poate fi răspândită gripa aviarii?

Factorii care pot contribui la răspândirea virusului :

- globalizarea și comerțul internațional;
- piețele de păsări vii;
- păsările sălbaticice și rutele de migrație

La păsări, virusul GA poate fi răspândită prin contact direct cu secreții de la păsările infectate, în special prin materiale fecale sau prin intermediul echipamentului, hranei și apei contaminante. Păsările sălbaticice pot transporta virusurile în tractul respirator sau intestinal, dar acestea nu se îmbolnăvesc în mod obișnuit, ceea ce le permite să eliminate virusul pe distanțe lungi.

Ce trebuie să întreprindă?

Ce trebuie să facă crescătorii de păsări din ferme?

- Anunțați medicul veterinar cu privire la orice caz de îmbolnăvire sau moarte la animale și păsări.
- Nu puneti mâna goală pe cadavrele păsărilor.
- Tineți păsările închise în adăposturi, pentru a evita contactul cu păsările din alte gospodării sau sălbaticice.
- Nu lăsați rătele și gîștele pe bălti sau lacuri.



ATENȚIE

ATENȚIE !

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR VASLUI RECOMANDĂ:
NOTIFICAREA D.S.V.S.A. VASLUI LA NUMĂRUL DE TELEFON 0235421121 DACĂ ÎN CAZUL DEPISTĂRII
DE CADAVRE DE PĂSĂRI DOMESTICE SAU SĂLBATICE

RECOMANDARI PENTRU PRODUCEREA DE LAPTE SI PRODUSE LACTATE DE CALITATE



Cum se poate obține lapte conform cu cerințele Uniunii Europene?



Păstrați curătenia în adăposturile vacilor;
Asigurați așternutul curat pentru menținerea igienei vacilor;
Îndepărtați bălegarul, urina, praful, noroiul, așternutul murdar;
Îndepărtați resturile de furaje înainte de începerea mulsului;
Nu hrăniți vacile cu săn sau paie în timpul mulsului;
Nu schimbați așternuturile de paie în timpul mulsului;

Verificați dacă vacile de lapte prezintă boli ale ugerului;
La cel mai mic semn de boală mulgeți-le separat și anunțați medicul veterinar;
Spălați bine ugerul și mameloanele și ștergeți-le cu un prosop curat;
Legați coada animalului înainte de începerea mulsului;



Spălați-vă mâinile și îmbrăcați un halat de protecție curat; dacă aveți răni deschise ale pielii mâinilor acoperiți-le cu bandaje igienice rezistente la apă sau folosiți mănuși de protecție;
Spălați cu detergent și clătiți bine gălețile și bidoanele folosite pentru laptă înainte de începerea mulsului;
Eliminați primele jeturi de lapte;



Mulgeți laptele în vase curate;
Filtrăți și depozitați laptele imediat după muls în vase curate,
acoperite, într-o încăpere separată de adăpostul vacilor;



Răciți laptele imediat după muls, la o temperatură de maxim 8°C atunci când este colectat zilnic și la 6°C atunci când colectarea nu este efectuată în fiecare zi;



Dacă nu dețineți echipamente adecvate pentru păstrarea și răcirea laptelui,
transportați laptele cât mai rapid la centrul de colectare, pentru a fi răciți și păstrați
corespunzător.