



ATENȚIE!

GRIPA AVIARĂ

Simptome și măsuri de prevenire



Ce este gripa aviară?

Gripa aviară (*Influența Aviară*) este o boală virală extrem de contagioasă cauzată de virusul gripal H5N8 care afectează mai multe specii de păsări de la care obținem produse alimentare (găini, curcani, prepelițe, bibilici, etc.), precum și păsările de companie și păsările sălbaticice. Ocazional boala o pot contracta mamiferele și omul.



Perioada de incubație este de 4-6 zile.

Cum poate fi răspândită gripa aviară?

Factorii care pot contribui la răspândirea virusului :

- globalizarea și comerțul internațional;
- piețele de păsări vii;
- păsările sălbaticice și rutele de migrație

La păsări, virusul GA poate fi răspândită prin contact direct cu secreții de la păsările infectate, în special prin materiile fecale sau prin intermediul echipamentului, hranei și apei contaminate. Păsările sălbaticice pot transporta virusurile în tractul respirator sau intestinal, dar acestea nu se îmbolnăvesc în mod obișnuit, ceea ce le permite să eliminate viruși pe distanțe lungi.

Cum se manifestă infecția?

Simptome clinice:

- Inapetență, încetarea ouatului;
- Respirație greoaie, tuse, febră;
- Creasta și bărbitele umflate, de culoare roșu închis;
- Pete vinete pe picioare și secreții din cioc și nări;
- Diaree apoasa, de culoare verzuie;
- Inflamarea zonelor din jurul ochilor și gâtului.
- aripi zburlite, torticolis, răsucirea gâtului, paralizie.

Ce trebuie de întreprins ?

- Anunțați medicul veterinar cu privire la orice caz de îmbolnăvire sau moarte la animale și păsări.
- Nu puneti măina goală pe cadavrele păsărilor.
- Țineți păsările închise în adăposturi, pentru a evita contactul cu păsările din alte gospodării sau sălbaticice.
- Nu lăsați rațele și giștele pe bălti sau lacuri.

Ce trebuie să facă crescătorii de păsări din ferme?

- Trebuie să respecte normele de biosecuritate și să acorde tot sprijinul medicilor veterini și autorităților sanită-veterinare.
- Să fie respectate regulile privind circulația și transportul păsărilor.



ATENTIE

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR VASLUI RECOMANDĂ:
NOTIFICAREA D.S.V.S.A. VASLUI LA NUMĂRUL DE TELEFON 0235421121 DACĂ ÎN CAZUL DEPISTĂRII
DE CADAVRE DE PĂSĂRI DOMESTICE SAU SĂLBATICICE

ATENTIE !

Dețineți găini, rațe, gâște?

Protejați-vă păsările de gripe aviară

Ştiați că?

În România, riscul contaminării cu virusul gripei aviară de la păsările sălbaticice este ridicat. Deoarece este o zoonoză și o boală foarte contagioasă, trebuie luate măsuri pentru prevenția contaminării păsărilor sau oamenilor.



Rețineți !

Orișoră, de la o boala sănătoasă și curată să devină sănătoasă și curată. Rețineți-vă și evaluăți.



Înainte de a contacta o altă persoană sau un alt animal, să evaluați.

Înainte de a consuma o frică sau o salată, să evaluați.

Sfat 1: Curățenia



Curățați încălțaminte și haine și după vizitarea păsărilor
dumneavoastră. Înțeță curtea curată și ordonată.
Dezinfectați suprafețele și cloratați cu regularitate.

Sfat 2: Hrănirea



Sfat 3: Împrejmuirea

Protejați păsările de curte de contactul cu păsările sălbaticice
sau alte animale prin împrejmuirea adecvată cu plasă a
zonelor în aer liber din timpul zilei sau nopții.



Sfat 4: Fii vigilant

www.ansvsa.ro/



Urmărește campaniile de informare publică și
ultimele noutăți legate de gripe aviară.



A.N.S.V.S.A.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranta Alimentelor



**PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ
ÎN EUROPA: FIȚI ATENȚI LA SEMNELE EI ȘI ANUNȚAȚI
MEDICUL VETERINAR!**

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți europeni de toate vîrstele, indiferent de gen.

Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?

Nu!

A mai evoluat boala în România?

Până în prezent, virusul nu a pătruns pe teritoriul României. Virusul poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultățile de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului, de aceea, teritoriul țării trebuie păstrat indemn.

Unde evoluează boala în prezent în Europa?


În Uniunea Europeană în Lituania, Letonia, Estonia, Polonia și Italia (insula Sardinia, în Federația Rusă, Ucraina, Belarus, foarte aproape de granița cu state ale Uniunii Europene.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.



- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată ($40,5 - 42^{\circ}\text{C}$) și stare febrilă;
- roșeață sau învinetire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morții;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;

Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
- alți vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.
- toate secrețiile, excrețiile, fluidele, țesuturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat;

În mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carne congelată mai mulți ani. Este cel mai rezistent virus, ceea ce-l face foarte periculos.



Pot fi animalele vaccinate împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei boli! Măsurile de prevenire (igienă alimentară și a exploatașilor, mișcările animalelor și măsurile de control aplicate de autoritățile împuternicate) sunt singurele metode care pot ține boala departe.

Există tratament pentru această boală?

NU!

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul meu;
- izolez imediat animalul bolnav, sau cadavrul de alte animale fără semne de boală și îl prezint medicului veterinar;
- mă oblig să nu arunc cadavrul animalului în locuri neamenajate.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
- toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în condiții de maximă securitate astfel încât să se împiedice orice transmitere a bolii;
- circulația animalelor va fi pusă sub restricții în perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile aflate în perimetru de restricții vor fi ținute sub observație;
- exploatațiile infectate vor fi dezinfecțiate, dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru reopulare când condițiile sunt întrunite.

De refățut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

Nu vă temeți de penalizări ale guvernului, contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea indemnizației țării!

Telefonul DS VS A la care se va anunța orice suspiciune este: